1G556330P2

FR

Nettacin Collyre 0,3%

Collyre en solution
Nétilmicine

Composition
100 ml contiennent :
Substance active : Nétilmicine sulphate 0,455 g équivalant à Nétilmicine 0,300 g
Excipients : Chlorure de sodium - chlorure de benzalkonium - eau purifiée

Forme pharmaceutique et contenu
Collyre, solution en flacon de 5 ml

Classe pharmacothérapeutique
La nétilmicine est un antibiotique aminoglycoside.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
SIFI S.p.A. - Via Ercole Patti, 36 – 95025 Aci S. Antonio (CT)

Fabricant
SIFI S.p.A. - Usine de Aci S. Antonio (CT)

Indications thérapeutiques
Traitement local des infections oculaires externes et des annexes de l'œil causées par des germes sensibles à la nétilmicine, y compris les germes produisant des enzymes d'adénylation et de phosphorylation.

Contre-indications
Hypersensibilité aux composants du médicament ou à d'autres aminoglycosides.

Précautions d'emploi
L'utilisation, surtout si prolongée, des produits pour usage local peut déclencher des réactions d'hypersensibilité. Dans ce cas arrêtez le traitement et consultez votre médecin pour commencer une thérapie adéquate.
L'usage du médicament doit être évité chez les nourrissons et les enfants en bas âge, sauf s'il est impérativement nécessaire et sous surveillance médicale stricte. L'utilisation de ce médicament n'est pas également recommandée pendant l'allaitement.
NETTACIN collyre n'est pas injectable et, par conséquent, ne doit pas être administré par voie sous-conjonctival ou dans la chambre antérieure.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interaction
Aucune interaction significative n'a été reportée avec l'utilisation de collyres à base de nétilmicine.
L'utilisation concomitante d'autres antibiotiques néphrotoxiques et ototoxiques (même en cas d'administration locale, en particulier intra-cavitaire) peut augmenter le risque

de ces effets. Une augmentation de la néphrotoxicité de certaines aminoglycosides a été décrite en cas d'utilisation concomitante ou successive d'autres substances potentiellement néphrotoxiques telles que le cisplatine, la polymixine B, la colistine, la viomycine, la streptomycine, la vancomycine, d'autres aminoglycoside et certaines céphalosporines (céphalosporidine) ou des diurétiques puissants tels que l'acide étacryinique et le furosémide à cause de ses effets sur le foie et devrait être évitée.
La combinaison d'un aminoglycoside avec un antibiotique bêtalactamique (pénicillines ou céphalosporines) peut entraîner une significative inactivation mutuelle. Une réduction de la demi-vie ou des niveaux plasmatiques d'amynoglicoside a été décrite chez les patients atteints d'insuffisance rénale et aussi chez certains patients avec une fonction rénale normale quand un antibiotique aminoglycoside et une pénicilline similaire ont été administrés par deux voies différentes.

Mises en garde spéciales

Un usage prolongé des antibiotiques locaux peut entraîner la croissance de micro-organismes résistants. Si vous ne ressentez aucune amélioration ou en cas d'irritations ou de réactions d'hypersensibilité, arrêtez le traitement et suivez une thérapie adéquate.

Posologie et mode d'administration

Instiller dans le cul-de-sac conjonctival une ou deux gouttes de collyre 3 fois par jour ou selon prescription médicale.
Evitez le contact avec l'extrémité du récipient.

Effets indésirables

NETTACIN collyre peut occasionnellement entraîner des irritations oculaires légères et transitoires ou des réactions d'hypersensibilité caractérisées par œdème, éruptions urticariennes et prurit.
Informez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'effets indésirables non décrits dans cette notice.

Date de péremption

La date de péremption est marquée sur l'emballage.
Attention : aucun médicament ne doit être utilisé après la date de péremption marquée sur l'emballage.

Conservez à une température ne dépassant pas 25 °C.

NETTACIN collyre dans le flacon multidose peut être utilisé jusqu'à 28 jours après la première ouverture.

USAGE OPHTALMIQUE

TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS

Date de la dernière révision : Mai 2018

Instructions pour l'utilisation :
Vissez à fond le capuchon jusqu'à percer le flacon.
Dévissez le capuchon, retourner le flacon et instiller en le pressant légèrement.
Revisser complètement le capuchon sur le flacon.